

SALMONELOSES (PARATIFOSE OU "MAL DA ASA"), COLIBACIOSES, MICOPLASMOSES (P)

As Salmoneloses são afecções graves dos pombos e de outras aves provocadas por salmonelas, *S. typhimurium* (paratifoze ou «Mal da Asa»), *S. gallinarum* e *S. sanguinarum*, e que causam sérias baixas nos pombos e borrachos, com os consequentes prejuízos para os columbófilos.

Acompanhadas muitas vezes por outras afecções polimicrobianas secundárias (micoplasmas e outras bactérias Gram-) que complicam e mascaram o quadro patológico inicial, torna-se necessário também actuar eficazmente sobre estes agentes.

A nova fórmula do **FP20/20 o.c.** conjuga dois quimioterápicos cuja associação lhe confere um largo espectro de acção, atingindo Gram + e Gram - e Micoplasmas.

Como terapêutico nas afecções supracitadas, o **FP20/20 O.C.** tem demonstrado uma eficácia indiscutível, tanto mais que não apresenta acções secundárias negativas, como a perda de rendimento ou apetite, quebras de postura, etc., tornando-se assim um produto de eleição a utilizar em Pombos-correios.

COMPOSIÇÃO POR kg

Espiramicina.....	320.000.000 UI
Colistina.....	380.000.000 UI
Excipiente.....	q.b.p 1000 g

INDICAÇÕES

É sempre preferível a prevenção das doenças do que a cura, pois que os pombos verdadeiramente atingidos pela salmonelose dificilmente recuperarão todas as suas potencialidades, pelo que infelizmente se torna preferível sacrificá-los.

No entanto e no caso de pombos de grande valor, de preferência machos, dos quais se pretenda aproveitar a sua descendência, poderá fazer-se com algum êxito um tratamento curativo.

Tratamento e prevenção de infecções das vias respiratórias superiores e inferiores (bronquite aguda ou crónica, pneumonia, sinusite, faringite, coriza infecciosa, micoplasmose, doença dos sacos aéreos e DRG).

Tratamento e prevenção de infecções do aparelho digestivo (enterites coliformes, salmoneloses e pasteureloses), cólera aviar, artrites bacterianas, onfalites e outras infecções por germes sensíveis.

Não fornecer frutas ou verduras durante o tratamento. O produto deve ser preparado diariamente.

Utilizar a colher-medida inclusa.

Após o tratamento deverá administrar-se um polivitamínico contendo Vitaminas do Complexo B (**VITA B COMPLEXO** ou **VITACHOK Total**).

MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSAGENS

PREVENÇÃO DE SALMONELOSES, COLIBACIOSES E MICOPLASMOSES (de preferência a toda a colónia):

Reprodutores: 5g (1 colher-medida cheia) por litro de água de bebida durante 7 dias consecutivos antes do início da postura e imediatamente a seguir ao nascimento dos borrachos durante a primeira semana de vida.

Crias: As mesmas doses dos adultos, durante a primeira semana de vida e nos 3 dias que se seguem à separação dos pais.

Voadores: 5 g (1 colher-medida cheia) por litro de água de bebida durante 5 a 7 dias após as provas e sempre que haja suspeita de contaminações.

TRATAMENTO EM CASO DECLARADO DE SALMONELOSES, COLIBACIOSES E MICOPLASMOSES (tratar toda a colónia):

Doses: 1.º ao 5º dia - **FP20/20 O.C.** 10g/litro (2 colheres-medida cheia).

6.º e 7.º dias - Água limpa, desinfectando bem o pombal e utensílios com **VIRUDINE** ou **VIRKON S**.

8.º ao 13.º dias - Repetir o tratamento, adicionando na mesma água de bebida o **FP20/20 O.C.** e **VITA B COMPLEXO**.

14.º e 15.º dias - Água limpa e desinfecção do pombal e utensílios com **VIRUDINE** ou **VIRKON S**.

16.º ao 21.º dia - **FP20/20 O.C.** (5g/litro) + **VITA B COMPLEXO**.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não associar quaisquer outras substâncias medicamentosas.

Contra-indicado nas aves com hipersensibilidade a qualquer dos constituintes e com insuficiência hepática ou doença renal crónica.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 50g e 100g de pó solúvel.

EQUIVALÊNCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas. | 1 colher de chá = ± 3cc = 60 gotas = ± 5 gramas de pó. | 1 colher de sopa = ± 9cc = 180 gotas = ± 15 gramas de pó.

OBSERVAÇÕES


O produto deve ser preparado diariamente.

Quando tratar de uma ave suspeita de doença, deve separá-la, sempre que possível, de todas as outras durante o período de tratamento até ao seu completo restabelecimento, desinfectando o alojamento com **VIRUDINE** ou **VIRKON S**. De Inverno as aves bebem menos, devendo pois aumentar-se ligeiramente as doses na água. Se por exemplo estiver a dar-se 2 cc de produto no Verão, no Inverno deve aumentar-se para 3 cc.

GUARDAR O PRODUTO EM LUGAR SECO, ESCURO E FRESCO (INFERIOR A 25°C), ROLHANDO BEM O FRASCO.

USO VETERINÁRIO - MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS

Fabricante: **Nº 002/08/DGV**

R.I.M.:  R. 1º de Dezembro, 1 – 2625-451 FORTE DA CASA – PORTUGAL
Telef. 21 956 79 16/7 – Fax 21 956 79 15
geral@avizoon.pt – www.avizoon.pt

SALMONELOSIS (PARATIFOSIS O "MAL DEL ALA"), COLIBACILOSIS, MICOPLASMOSIS (E)

Las Salmonelosis son enfermedades importantes de los palomos así como de otras aves, provocadas por Salmonellas, *S. typhimurium* (Paratifosis o "Mal del Ala"), *S. galinarium* y *S. sanguinarum*, y que causan graves bajas, tanto en los palomos adultos como en los pichones, con los consecuentes prejuicios para los aficionados.

Asociadas muchas veces a otras enfermedades polimicrobianas secundarias (micoplasmas y otras por bacterias Gran-) que complican y enmascaran el cuadro patológico inicial, es necesario actuar también eficazmente sobre estos agentes.

La nueva fórmula del **FP20/20 o.c.** combina dos quimioterápicos cuya asociación le confiere un largo espectro de acción, alcanzando Gram + Gram - y Micoplasmas.

Como terapéutica en las infecciones supra mencionadas, el **FP20/20 o.c.** tiene demostrado una eficacia indiscutible, más aún porque no presenta acciones secundarias negativas como la disminución del rendimiento o apetito, quiebras de postura, etc., por lo que se vuelve un producto de selección para los Palomos Mensajeros.

COMPOSICIÓN POR kg

Espiramicina.....	320.000.000 UI
Colistina.....	380.000.000 UI
Excipiente.....	q.b.p 1000 g

INDICACIONES

Es siempre preferible la prevención de las enfermedades que de la cura, ya que los palomos verdaderamente afectados raramente recuperan en su totalidad todas sus potencialidades siendo preferible sacrificarlos.

Sin embargo, y en caso de animales de gran valor, en que se pretende aprovechar de cualquier forma su descendencia, podemos, con algún éxito, hacer un tratamiento curativo.

Tratamiento y prevención de las infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores (bronquitis aguda o crónica, neumonía, sinusitis, faringitis, coriza infecciosa, micoplasmosis, enfermedad de los sacos de aire y la DRC).

Tratamiento y prevención de las infecciones del sistema digestivo (enteritis coliformes, salmonelosis y pasteurelisis), el cólera aviar, la artritis bacteriana, onfalitis y otras infecciones causadas por gérmenes sensibles.

No se debe suministrar frutas ni verduras durante el tratamiento. Este producto deberá ser preparado diariamente.

Utilizar la cuchara dosificadora que incluimos.

Tras el tratamiento, se debe suministrar un polivitamínico que contenga Vitaminas del Complejo B (**VITA B COMPLEXO** o **VITACHOK Total**).

MODO DE UTILIZACIÓN Y DOSIS

PREVENCIÓN DE LAS SALMONELOSIS, COLIBACILOSIS Y MICOPLASMOSIS (de preferencia a toda la colonia):

Reproductores: 5g (1 cuchara dosificadora) por litro de agua de bebida durante 7 días consecutivos antes del inicio de la postura e inmediatamente después del nacimiento de los pichones durante la primera semana de vida.

Crias: Las mismas dosis de los adultos, durante la primera semana de vida e los 3 días que se siguen a la separación de los padres.

Voladores: 5 g (1 cuchara dosificadora) por litro de agua de bebida durante 5 a 7 días después de las pruebas y siempre que haya sospechas de contaminaciones.

TRATAMIENTO EN CASOS DECLARADOS DE SALMONELOSIS, COLIBACILOSIS Y MICOPLASMOSIS (tratar toda la colonia):

Dosis: 1.º al 5º días - **FP20/20 O.C.** - 10g/litro (2 cucharas dosificadoras llenas).

6.º y 7.º días - Agua limpia, desinfectando bien el palomar y utensilios con **VIRUDINE** o **VIRKON S**.

8.º al 13.º días - Repetir el tratamiento adicionando en la misma agua de bebida el **FP20/20 O.C.** y **VITA B COMPLEXO**.

14.º y 15.º días - Agua limpia y desinfección del palomar y utensilios con **VIRUDINE** o **VIRKON S**.

16.º al 21.º día - **FP20/20 O.C.** (5g/litro) + **VITA B COMPLEXO**.

CONTRA INDICACIONES

No asociar ningunas otras substancias medicamentosas.

Contraindicado en las aves con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes e insuficiencia hepática o enfermedad renal crónica.

PRESENTACIÓN

Embalajes de 50g y 100g de polvo soluble.

EQUIVALENCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas. | 1 cuchara de té = ± 3cc = 60 gotas = ± 5 gramos de polvo. | 1 cuchara de sopera = ± 9cc = 180 gotas = ± 15 gramos de polvo.

OBSERVACIONES

Lo producto debe ser preparado diariamente.

Cuando trate un ave sospechosa de enfermedad, debe separarse, siempre que sea posible de todas las otras, durante el periodo de tratamiento hasta su completo restablecimiento, desinfectándose el alojamiento con **VIRUDINE** o **VIRKON S**.

Durante el invierno las aves beben menos, debiendo pues aumentar ligeramente las dosis en el agua. Si por ejemplo tuviéramos que dar 2 cc de un producto en el verano, en invierno debe aumentarse para 3 cc.

CONSERVAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR SECO, OSCURO Y FRESCO (A MENOS DE 25 ° C). CERRANDO BIEN LOS FRASCOS.

USO VETERINARIO - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricante: **Nº 002/08/DGV**

R.I.M.: R. 1.º de Dezembro, 1 – 2625-451 FORTE DA CASA – PORTUGAL

Telef. 21 956 79 16/7 – Fax 21 956 79 15

geral@avizoon.pt – www.avizoon.pt

