

# VITACHOK Total

COL

CHOQUE VITAMÍNICO (P)

Um polivitamínico de eleição, necessário como suplemento de alimentação animal, quase sempre deficiente e incompleta em elementos nutritivos essenciais.

## INDICAÇÕES

**VITACHOK Total** pode prevenir situações de convalescença arrastada, deficiente crescimento, perturbações de fertilidade, avitaminoses de uma maneira geral, como os estados de stress, após antibioterapia e desparasitações. É facilmente administrável na água de bebida.

## COMPOSIÇÃO POR LITRO

Vitamina A.....	12 500 000 UI	Vitamina B12 .....	4 000 µg
Vitamina D3 .....	2 500 000 UI	Vitamina C .....	12 500 mg
Vitamina E .....	10 000 mg	Pantotenato de Cálcio.....	3 500 mg
Vitamina B1.....	1 000 mg	Nicotinamida .....	7 500 mg
Vitamina B2 .....	1 000 mg	Colina (Cloreto) .....	25 000 mg
Vitamina B6 .....	1 000 mg	Excipiente .....	q.b.p. 1 000 cc

## MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSES

### POMBOS:

10 ml por litro de água de bebida durante 5 dias consecutivos por mês.

O produto deve ser preparado todos os dias.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens de 100 cc.

## INFORMAÇÕES DE INTERESSE

### PESOS MÉDIOS:

#### POMBOS:

LIGEIROS - 250 a 300 g

MÉDIOS - 450 a 500 g

PESADOS - Até 1000 g

### CONSUMOS DIÁRIOS APROXIMADOS:

#### POMBOS:

Água - 45 a 50 ml

Sementes - 1/10 do peso ou 20 a 100 g/dia

## EQUIVALÊNCIAS

1 colher de chá = ± 3cc = 60 gotas = ± 5 gramas de pó.

1 colher de sopa = ± 9cc = 180 gotas = ± 15 gramas de pó.

1 ml = 1 cc = 20 gotas.

## OBSERVAÇÕES

Os produtos devem ser preparados todos os dias.

Quando tratar de uma ave suspeita de doença, deve separá-la, sempre que possível, de todas as outras durante o período de tratamento até ao seu completo restabelecimento, desinfectando-se o alojamento com VIRUDINE ou VIRKON S.

De Inverno as aves bebem menos, devendo pois aumentar-se ligeiramente as doses na água. Se, por exemplo, estivermos a dar 2 cc de produto no Verão, no Inverno deve aumentar-se para 3 cc.

GUARDAR DE PREFERÊNCIA TODOS OS PRODUTOS EM LUGAR SECO, ESCURO E FRESCO. ROLHANDO BEM OS FRASCOS.

USO VETERINÁRIO - MANTER OS FRASCOS FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS

Fabricado por : Gufarma (Portugal)

R.I.M.:



R. 1º de Dezembro, 1 - 2625-451 FORTE DA CASA - PORTUGAL

Telef. 21 956 79 16/7 - Fax 21 956 79 15

geral@avizoon.pt - www.avizoon.pt

# VITACHOK Total

COL

CHOQUE VITAMÍNICO (E)

Se trata de un polivitamínico de elección, necesario como suplemento de la alimentación animal, casi siempre deficiente y incompleta en elementos nutritivos esenciales.

## INDICACIONES

**VITACHOK Total** puede prevenir situaciones de convalecencia arrastrada, crecimiento deficiente, perturbaciones de fertilidad, avitaminosis de una forma general, así como las situaciones de stress, después de antibioterapia y desparasitaciones como choque vitamínico. Se administra fácilmente en el agua de beber.

## COMPOSICIÓN POR LITRO

Vitamina A.....	12 500 000 UI	Vitamina B12 .....	4 000 µg
Vitamina D3 .....	2 500 000 UI	Vitamina C .....	12 500 mg
Vitamina E .....	10 000 mg	Pantotenato de Calcio.....	3 500 mg
Vitamina B1.....	1 000 mg	Nicotinamida .....	7 500 mg
Vitamina B2 .....	1 000 mg	Colina (Cloreto) .....	25 000 mg
Vitamina B6 .....	1 000 mg	Excipiente .....	q.b.p. 1 000 cc

## MODO DE UTILIZACIÓN Y DOSIS

### PALOMAS:

10 ml por litro de agua de bebida durante 4 a 5 días consecutivos al mes.

El producto debe ser preparado todos los días.

## PRESENTACIÓN

Frascos cuenta gotas de 30 cc y embalajes de 100 cc.

## INFORMACIONES DE INTERÉS

### PESOS MÉDIOS:

#### PALOMAS:

LIGERAS - 250 a 300 g

MÉDIAS - 450 a 500 g

PESADAS - Até 1000 g

### CONSUMOS DIÁRIOS APROXIMADOS:

#### PALOMAS:

Agua - 45 a 50 ml

Semillitas - 1/10 del peso o 20 a 100 g/día

## EQUIVALENCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas.

1 cuchara de té = ± 3cc = 60 gotas = ± 5 gramos de polvo.

1 cuchara de sopa = ± 9cc = 180 gotas = ± 15 gramos de polvo.

## OBSERVACIONES

Los productos deben ser preparados todos los días.

Cuando trate un ave sospechosa de enfermedad, debe separarse, siempre que sea posible de todas las otras, durante el periodo de tratamiento hasta su completo restablecimiento, desinfectándose el alojamiento con VIRUDINE o VIRKON S.

Durante el invierno las aves beben menos, debiendo pues aumentar ligeramente las dosis en el agua. Si por ejemplo tuviéramos que dar 2 cc de un producto en el verano, en invierno debe aumentarse para 3 cc.

GUARDAR DE PREFERENCIA TODOS LOS PRODUCTOS EN LUGAR SECO, OSCURO Y FRESCO, CERRANDO BIEN LOS FRASCOS.

USO VETERINARIO - NO DEJAR LOS FRASCOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.3

Fabricado por : Gufarma (Portugal)



R. 1º de Dezembro, 1 - 2625-451 FORTE DA CASA - PORTUGAL  
Telef. 21 956 79 16/7 - Fax 21 956 79 15  
geral@avizoon.pt - www.avizoon.pt