

VITACHOK Total

ORNI

CHOQUE VITAMÍNICO (PT)

Um polivitamínico de eleição, necessário como suplemento de alimentação animal, quase sempre deficiente e incompleta em elementos nutritivos essenciais.

INDICAÇÕES

Indicado como coadjuvante de ações de tratamento de hipovitaminoses e infecções respiratórias, epiteliais, parasitárias e polineurites, e como coadjuvante de ações de profilaxia na prevenção de hipovitaminoses durante a época de reprodução dos animais ou quando submetidos a frio ou calor intenso e em situações caracterizadas por anorexia, astenia, debilidade geral e atraso de crescimento.

VITACHOK Total pode prevenir situações de convalescência arrastada, perturbações de fertilidade, avitaminoses de uma maneira geral, como os estados de stress, após antibioterapia e desparasitações. É facilmente administrável na água de bebida.

COMPOSIÇÃO POR LITRO

Vitamina A.....	12 500 000 UI	Vitamina B2	1 000 mg	Pantotenato de Cálcio.....	3 500 mg
Vitamina D3	2 500 000 UI	Vitamina B6	1 000 mg	Nicotinamida	7 500 mg
Vitamina E	10 000 mg	Vitamina B12	4 000 µg	Colina (Cloreto)	25 000 mg
Vitamina B1.....	1 000 mg	Vitamina C	12 500 mg	Excipiente	q.b.p. 1 000 cc

ESPÉCIES ANIMAIS A QUE SE DESTINA

Aves canoras e ornamentais, pombos, psitacídeos, coelhos anões, cricetos e outros pequenos roedores de companhia.

Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas.

Não administrar a animais que se destinam ao consumo humano.

MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSES

Os bebedouros devem ser lavados desinfetados e enxaguados antes de cada diluição.

O produto deve ser preparado todos os dias, duas a três vezes por dia.

CANÁRIOS, INDÍGENAS, EXÓTICOS OU AVES DE PESO APROXIMADO:

3 a 4 gotas por bebedouro (de 40 a 50 ml) ou 2,5 ml por litro de água de bebida durante 7 dias consecutivos por mês.

PERIQUITOS, PSITACÍDEOS (CATURRAS, PAPAGAIOS, ARARAS, ETC.), OU AVES DE PESO APROXIMADO:

6 a 7 gotas por bebedouro (de 40 a 50 ml) ou 5 ml por litro de água de bebida durante 7 dias consecutivos por mês.

POMBOS E OUTROS COLUMBIFORMES:

6 a 7 gotas por bebedouro (de 40 a 50 ml) ou 5 ml por litro de água de bebida durante 7 dias consecutivos por mês.

Coelhos anões, Cricetos e outros pequenos roedores de companhia:

2,5ml por litro de água de bebida.

Cobaios e Gerbos:

7,5ml por litro de água de bebida.

APRESENTAÇÃO

Frascos conta-gotas de 30 ml ou embalagens de 100 ml.

EQUIVALENCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas. | 1 colher de chá = ± 3cc = 60 gotas = ± 5 gramas de pó. | 1 colher de sopa = ± 9cc = 180 gotas = ± 15 gramas de pó.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E OBSERVAÇÕES EXIGÍVEIS

Não utilizar durante a postura e a gestação. Restringir o aporte de cálcio na fase do tratamento.

As pessoas com hipersensibilidade conhecida aos constituintes devem evitar o contacto com o produto. Para além de cumprir com as boas práticas de manipulação de medicamentos, incluindo as regras de higiene, como a lavagem imediata das mãos ou outras zonas do corpo que contactem inadvertidamente com o produto, não estão descritos outros cuidados especiais a tomar pelo utilizador.

Quando tratar de uma ave suspeita de doença, deve separá-la, sempre que possível, de todas as outras durante o período de tratamento até ao seu completo restabelecimento, desinfetando-se o alojamento com VIRUDINE ou VIRKON S.

De Inverno as aves bebem menos, devendo pois aumentar-se ligeiramente as doses na água. Se, por exemplo, estivermos a dar 2 cc de produto no Verão, no Inverno deve aumentar-se para 3 cc.

GUARDAR DE PREFERÊNCIA TODOS OS PRODUTOS EM LUGAR SECO, ESCURO E FRESCO. ROLHANDO BEM OS FRASCOS.

USO VETERINÁRIO - MANTER OS FRASCOS FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS

Fabricante N.º ES/002V/10

R.I.M.:



R. 1º de Dezembro, 1 - 2625-451 Forte da Casa - PORTUGAL
Telef. 21 956 79 16/7 - Fax 21 956 79 15
geral@avizoon.pt - www.avizoon.pt

VITACHOK Total

ORNI

CHOQUE VITAMÍNICO (ES)

Un polivitamínico de elección, necesario como suplemento de la alimentación animal, casi siempre deficiente y incompleta en elementos nutritivos esenciales.

INDICACIONES

Indicado como tratamiento adyuvante de las acciones de las infecciones respiratorias, y la hipovitaminosis epitelial, parasitarias y polineuritis, y como acción coadyuvante de la profilaxis en la prevención de la deficiencia de vitamina durante la época reproductiva o cuando los animales sometidos a un intenso calor y frío, o en situaciones caracterizadas por anorexia, fatiga, debilidad general y retraso del crecimiento.

VITACHOK Total puede prevenir situaciones de convalecencia arrastrada, crecimiento deficiente, perturbaciones de fertilidad, avitaminosis de una forma general, así como las situaciones de stress, después de antibioterapia y desparasitaciones como choque vitamínico. Se administra fácilmente en el agua de beber.

COMPOSICIÓN POR LITRO

Vitamina A.....	12 500 000 UI	Vitamina B2	1 000 mg	Pantoteno de Cálculo.....	3 500 mg
Vitamina D3	2 500 000 UI	Vitamina B6	1 000 mg	Nicotinamida	7 500 mg
Vitamina E	10 000 mg	Vitamina B12	4 000 µg	Colina (Cloreto)	25 000 mg
Vitamina B1.....	1 000 mg	Vitamina C	12 500 mg	Excipiente	q.b.p. 1 000 cc

ESPECIE ANIMAL AS QUE SE DESTINA

Aves canoras y ornamentales, loros, conejos enanos, hámster y la compañía de otros pequeños roedores.

No utilizar en otras especies animales además de aquellos.

No utilizar en animales destinados al consumo humano.

MODO DE UTILIZACIÓN Y DOSIS

Los bebedores deben ser lavados desinfectados y lavados antes de cada dilución.

El producto debe ser preparado diariamente, dos o tres veces por día.

CANARIOS, INDÍGENAS, EXÓTICOS O AVES DE PESO APROXIMADO:

3 a 4 gotas por bebedero (de 40 a 50 ml) o 2.5 ml por litro de agua de bebida durante 7 días consecutivos al mes.

PERIQUITOS, PSITACÍDEOS (CATORRAS, LOROS, GUACAMAYAS, ETC.), O AVES DE PESO APROXIMADO:

6 a 7 gotas por bebedero (de 40 a 50 ml) o 5 ml por litro de agua de bebida durante 7 días consecutivos al mes.

PALOMOS Y OTROS COLUMBIFORMES:

6 a 7 gotas por bebedero (de 40 a 50 ml) o 5 ml por litro de agua de bebida durante 7 días consecutivos al mes.

Conejos enanos, hámsters y otros roedores pequeños de la compañía:

2.5 ml por litro de agua potable.

Conejillos de indias y jirbos:

7.5 ml por litro de agua potable.

PRESENTACIÓN

Frascos cuenta gotas de 30 ml y embalajes de 100 ml.

EQUIVALENCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas. | 1 cuchara de té = ± 3cc = 60 gotas = ± 5 gramos de polvo. | 1 cuchara de sopa = ± 9cc = 180 gotas = ± 15 gramos de polvo.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y OBSERVACIONES NECESARIAS

No utilizar durante la gestación y la postura. Restringir el uso de calcio en la fase de tratamiento.

Las personas con hipersensibilidad conocida a los mandantes deben evitar contacto con el producto. Además de cumplir con las buenas prácticas de manipulación de medicamentos, incluidas las normas de higiene como el lavado de la inmediata manos u otro tipo de cuerpo inadvertidamente en contacto con el producto, otros se describen en el cuidado especial tomada por el usuario.

Cuando trata un ave sospechosa de enfermedad, debe separarse, siempre que sea posible de todas las otras, durante el periodo de tratamiento hasta su completo restablecimiento, desinfectándose el alojamiento con VIRUDINE o VIRKON S.

Durante el invierno las aves beben menos, debiendo pues aumentar ligeramente las dosis en el agua. Si por ejemplo tuviéramos que dar 2 cc de un producto en el verano, en invierno debe aumentarse para 3 cc.

GUARDAR DE PREFERENCIA TODOS LOS PRODUCTOS EN LUGAR SECO, OSCURO Y FRESCO, CERRANDO BIEN LOS FRASCOS.

USO VETERINARIO - NO DEJAR LOS FRASCOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricante N.º ES/002V/10



R.I.M.: R. 1º de Dezembro, 1 - 2625-451 Forte da Casa - PORTUGAL
Telef. 21 956 79 16/7 - Fax 21 956 79 15
geral@avizoon.pt - www.avizoon.pt